

EMBARAZO	CLÍNICA			
SARS-CoV-2	ASINTOMÁTICO	LEVE en domicilio	MODERADA (encamamiento en domicilio)	NEUMONIA / INGRESO HOSPITALARIO
Positivo	Valorar factores clínicos de riesgo de progresión COVID-19: • No vacunadas • Tercer trimestre • Edad > 35 años • Obesidad • Comorbilidad: HTA, diabetes pre-gestacional, enfermedad cardiopulmonar, enfermedad renal, inmunosupresión (trasplante, infección VIH, tratamiento prolongado con corticoides...) Ausencia de factores de riesgo: no precisa HBPM. Si factores de riesgo: HBPM dosis profiláctica ajustada al peso 2 semanas.		HBPM dosis profiláctica ajustada al peso 2 semanas y hasta 7 días tras resolución del cuadro.	HBPM dosis profiláctica ajustada al peso. En domicilio tras hospitalización: continuar profilaxis 1 mes. Valorar en 3 ^{er} trimestre prolongar hasta parto + 6 semanas postparto.
Sospechoso por clínica sugestiva	Si se ha realizado el test, esperar resultado y actuar según el mismo. Reevaluar otros FR de ETV y situación clínica. Reevaluar cada 48-72 hr. Indicar a la paciente que, en caso de empeoramiento, contacte con su centro de salud, su obstetra o equipo de guardia de obstetricia			Actuar como si fuese positivo.
Sospechoso por contacto con positivo, pero sin síntomas	Si se hubiese realizado el test, esperar resultado y actuar según el mismo y FR de ETV. Informar sobre síntomas y dar recomendaciones de aislamiento en domicilio. Indicar a la paciente que, en caso de aparición de síntomas, contacte con su centro de salud, su obstetra o el equipo de guardia de obstetricia.			
Negativo	Hidratación adecuada y promover la movilización Evaluar FR de trombosis en embarazo http://www anticoagulationyembarazo.com/			

*Actualizar siempre anamnesis en cuanto a factores de riesgo (FR) de ETV